



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Acylophorus*, **Art:** *Acylophorus glaberrimus* (Herbst, 1784) **Synonymer:**

Kännetecken

En 6–7 mm lång kortvinge med långsträckt spolförmig kropp och påfallande litet huvud. Kroppen är svart, benen svarta med rödaktiga knän och fötter. Arten är svår att bestämma och bestämningen bör därför granskas av en specialist.

Utbredning och status

Endast funnen i Skåne. Känd från en lokal nära Hässleholm, där arten påträffades under 1940- och 1950-talen i en våtmark som inte längre existerar. År 2015 återupptäcktes arten på en lokal nära Kristianstad. Arten är liten och har ett undanskymt levnadssätt, varför mörkertalet kan antas vara betydande. Närmast utanför Sverige förekommer arten i Danmark, där den endast påträffats på Själland, och i Baltikum (Lettland). Världsutbredningen sträcker sig ifrån Västeuropa söderut till Nordafrika och österut till Turkmenistan. Arten betecknas på den danska rödlistan som sårbar.

Ekologi

Ett marklevande rovdjur som lever i blöta, mossrika gungflyn i öppna kärr och mossar. Arten är funnen i ett rikkärr och i igenväxande torvgravar med vegetation av bl.a. säv och ett bottenkikt av främst brunmossor. Biotopvalet i Danmark och Mellaneuropa är alldeles likartat. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas främst under fortplantningstiden på försommaren.

Hot

Artens livsmiljö påverkas av såväl ändrade brytningsformer vid torvtäkt som av eutrofiering av mossar och kärr.

Åtgärder

Arten är troligen delvis förbisedd, och bör eftersökas.

Litteratur

Israelson, G. 1966. Coleopterfaunan i Statten mosse. *Natur i Göinge* 1966.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. Rev. Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.