

Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar), **Ordning:** Salmoniformes (laxartade fiskar), **Familj:** Salmonidae (laxfiskar), **Släkte:** *Salvelinus* Richardson, 1836 **Synonymer:** rödingar

Kännetecken

Släktet *Salvelinus* (rödingar) är relativt väl studerat, men indelningen i arter är ofullständig, omtvistad och svårgörig, speciellt för de europeiska formerna. Uppemot 60 arter har urskiljts, av vilka många förekommer i Europa. Merparten av dessa arter är endemiska för en eller ett fåtal mer eller mindre isolerade sjöar, och flera av dem är redan utdöda. Arterna i släktet *Salvelinus* är med sin spolformade kropp och sina kraftiga, tandförsedda käkar snarlika lax och öring i släktet *Salmo*. Utmärkande för rödingar är de mindre och talrikare fjällen. Plogbenet i gommen är kort, och längs plogbenshuvudets bakkant finns en enkel tvärrad med tänder. Enstaka tänder i en längsrad, vilka är förankrade i en kamlik utväxt från plogbenshuvudet, kan också förekomma. Färgteckningen varierar mellan olika arter och bestånd, men genomgående saknas svarta prickar på kroppen. Kontrasterande mönster utgörs istället av ljus gulvita, rosa eller röda prickar på en mörkare bakgrund. Hos vissa arter bildar också den ljusare färgteckningen ett marmorerat mönster. Rödingar har ofta en markerad vit framkant på analfenan (kan också vara vitaktig hos öring *Salmo trutta*), men hos rödingar är detta starkt framträdande även på bröstfenorna, bukfenorna och ibland också på stjärtfenan.

Övrigt

Namngivning: *Salmo* (*Salvelinus*) Richardson, 1836. Fauna Boreali-Amaericana, 3, The Fish: 169.

Etymologi: *Salvelinus* = renässanslatinisering av Salvelin, en uppfattning av det tyska namnet på rödingar, Saibling

Litteratur

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Författare

Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).