

Microporus nigrita

Svart sandtaggbening

Halvingar, Skinnbaggar



NE NA LC DD NT **VU** EN CR RE

Sårbar (VU)
B2ab(iii)

Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Hemiptera (halvvingar), **Familj:** Cydnidae (tornbenskinnbaggar), **Släkte:** *Microporus*, **Art:** *Microporus nigrita* - svart sandtaggbening (J.C.Fabricius, 1794) **Synonymer:** *sotsvart tornbenskinnbagge*, *Microporus nigritus* (J.C.Fabricius, 1794)

Kännetecken

Sotsvart tornbenskinnbagge är en relativt bred, och jämt, rundad skinnbagge. Färgen är glänsande svart färg, och kroppen är tydligt punkterad. Antennerna är relativt korta. Benen är rikligt försedda med tornar. Kroppslängd 4–5 mm.

Utbredning och status

I Sverige är arten funnen i Skåne på fyra lokaler, och Blekinge på en lokal. Utbredningen i Sverige är kraftigt fragmenterad och förekomstområdet begränsat. Arten har sin nordligaste utbredning i Sverige och närmast funnen i Tyskland, Baltikum och österut. Arten en vidare palearktisk utbredning.

Ekologi

Arten lever på torr, sandig mark med gles vegetation. Den livnär sig på att suga växtsafter från rötter, särskilt gräs. Arten gräver sig ner i sanden till maximalt 10 cm djup. Tidvis kan man dock finna arten uppe på marken under torra växtdelar. Övervintrar som vuxen och lägger ägg på våren-försommaren. Den nya vuxna generationen kan ses i slutet av juli.

Hot

Igenväxning av torr, sandig mark med gles vegetation som ett resultat av upphörd hävd.

Åtgärder

Bevara öppna, solexponerade, sandiga, och örtrika habitat genom lämplig hävd.

Litteratur

Wagner, E. 1966. *Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha*. Die Tierwelt Deutschlands 54: 1-235.

Författare

Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.