



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Leiodidae (mycelbaggar), **Släkte:** *Agathidium*, **Art:** *Agathidium plagiatum* (Gyllenhal, 1810) **Synonymer:**

## Kännetecken

En 2,5 till 3 mm lång, brett oval och starkt välvd skalbagge. Översidan är glänsande svartbrun med en ljusare längsstrimma mitt på varje täckvinge. Hos vissa hanar är vänster käke utdragen uppåt som ett tydligt horn.

## Utbredning och status

Sentida fynd endast från Skärälid i Skåne. Gamla fynd föreligger dessutom från Västergötland. Saknas i övriga Norden, närmast i Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Turkiet och Iran.

## Ekologi

Larvutvecklingen sker i olika arter av slemsvampar som växer på död ved. I Skåne främst på gamla boklågor där den påträffas sittande nära slemsvampar på starkt vitrötad ved, eller i bokförnan under lågorna. Arten kan påträffas som fullbildad insekt under en stor del av året.

## Hot

Arten hotas av brist på utvecklingssubstrat i brukad skog.

## Åtgärder

Om arten skulle påträffas på ytterligare någon lokal i Sydsverige bör omedelbara skyddsåtgärder vidtagas för att gynna den.

## Litteratur

- Horion, A. 1949. *Faunistik der deutschen Käfer. Bd. II*: 168. Frankfurt a. M.  
Lundberg, S. 1967. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar 10. *Ent. Tidskr.* 88: 76.  
Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. *Opusc. Ent. Suppl. XVI*: 219. Lund.

## Författare

Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.