



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Agyrtidae (sumpbaggar), **Släkte:** *Agyrtes*, **Art:** *Agyrtes bicolor* Laporte de Castelnau, 1840 **Synonymer:**

Kännetecken

En 5 mm lång, mörkbrun, högvälvd, relativt långsmal och ganska starkt glänsande skalbagge. Täckvingarna har fördjupade punktrader.

Utbredning och status

Det enda kända svenska fyndet av arten gjordes 1974 vid Häckeberga i Skåne. Närmast i Danmark, där den påträffats på flera lokaler men ej är återfunnen efter 1950. Världsutbredningen omfattar Mellan- och Sydeuropa och sträcker sig österut till Rumänien.

Ekologi

Biologin är dåligt känd, men arterna inom familjen *Agyrtidae* anses vanligen vara saprofager. Fullbildade individer kan påträffas i trädsvampar o. dyl. på gamla döda lövträdsstockar, under mossa och bark samt i myrstackar.

Hot

Arten har troligen en mycket begränsad förekomst i Sverige, och kan dessutom ha en koppling till äldre lövträdsbestånd.

Åtgärder

Arten behöver eftersökas, och dess levnadssätt klargöras.

Litteratur

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera) 1 del. *Ent. Meddel.* 33: 71.

Horion, A. 1949. *Faunistik der deutschen Käfer. Bd. II:* 89–90, 373. Frankfurt a. M.

Lundberg, S. 1977. Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1974–1975 (Coleoptera). *Ent. Tidskr.* 98: 7.

Författare

Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2017. © ArtDatabanken, SLU 2005.