



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Aleochara*, **Art:** *Aleochara spissicornis* Erichson, 1839 **Synonymer:**

Kännetecken

En 2,4–2,6 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Kroppen är glänsande svart, halskölden oftast brunaktig, täckvingar, antennbas och ben rödgula, bakkroppsspetsen rödbrun. Arten kan vara svår att skilja från närstående, allmänna arter.

Utbredning och status

Känd från Halland, Öland och Gotland. Få lokaler är kända, men arten är med stor sannolikhet förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Ej känd från de övriga nordiska länderna eller Baltikum. I Mellaneuropa har arten en sydlig utbredning.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. Arten påträffas på olika torra, öppna marker. På Öland har arten bl.a. påträffats i anslutning till ett sorkbo under sten på alvartorräng. Andra fynd är gjorda på sandiga havsstränder. Också i Mellaneuropa är flertalet fynd gjorda på torrmarkslokaler med ett varmt lokalklimat. Flera (möjligen alla) arter i släktet *Aleochara* utvecklas som parasitoider på flugor.

Hot

Artens status och eventuell hotbild är svårbedömd.

Åtgärder

Kunskapen behöver ökas.

Litteratur

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. *Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20*.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.