



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Amauronyx*, **Art:** *Amauronyx maerkelii* (Aubé, 1844) **Synonymer:**

Kännetecken

En rödbrun, ganska långsträckt art som är 2 mm lång. Benen och antennerna är kraftigt byggda. De yttersta två antennlederna bildar en tydlig klubba. På huvudets ovansida finns en bågböjd fåra. Halsskölden har en längs- och en tvärfåra. Täckvingarna har vardera ett par längsfårer.

Utbredning och status

Funnen vid tre tillfällen i Skåne: i Malmö vid mitten av 1800-talet samt vid Lund 1940 och 1980. Närmast i Danmark. Världsbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa till den europeiska delen av Ryssland.

Ekologi

Lever främst på öppen mark under stenar m.m. hos olika myror, särskilt *Lasius*- och *Formica*-arter. Funnen på detta sätt även hos oss. Ett svenskt fynd gjordes i driftmaterial vid en översvämning. Arten påträffas även i olika trädbiotoper; under bark, i murken ved, i mulm och intill gamla stubbar, ofta (men inte alltid) tillsammans med myror.

Hot

Arten har en begränsad utbredning i sydvästra Skåne och hotas där starkt av olika slags exploatering, dikning, avverkning och städning av parker, alléer, skogsdungar och större markfastigheter.

Åtgärder

Det är av yttersta vikt att gamla träd och stubbar sparas. Likaså bör en detaljerad inventering av arten genomföras för att öka vår kunskap om dess habitatkrav.

Litteratur

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). *Ent. Medd.* 33: 190.

Författare

Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.