



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Malachiidae, **Släkte:** Apalochrus, **Art:** *Apalochrus femoralis* Erichson, 1840 **Synonymer:** *Paratinus femoralis* (Erichson, 1840)

## Kännetecken

---

En 3,5–4 mm lång skalbagge med långsträckt parallell kropp och långa extremiteter. Kroppen är svart med metalliskt blågröna täckvingar, skenben och fötter gula.

## Utbredning och status

---

Känd från Skånes syd- och ostkust samt en lokal i Norrbotten (Haparanda sandskår). Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Centraleuropa österut till Turkestan.

## Ekologi

---

Lever i tuvor av strandråg i flygsanddyner vid havet. I Mellaneuropa förekommer arten även på salthaltiga lokaler i inlandet, t.ex. vid Neusiedlersee. Larven är ett rovdjur. Fullbildade individer påträffas från juni till augusti.

## Hot

---

Arten missgynnas av exploatering av kustnära dyner, samt troligen också av igenväxning.

## Åtgärder

---

Flygsanddyner måste skyddas från exploatering, och skötas på ett adekvat sätt för att förhindra igenväxning.

## Författare

---

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.