



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Cryptophagidae (fuktbaggar),
Släkte: *Atomaria*, **Art:** *Atomaria abietina* J. Sahlberg, 1888 **Synonymer:** *Atomaria norica* Ganglbauer, 1899

Kännetecken

En brun och långsmal cirka 1,6 mm lång skalbagge. Täckvingarna, benen och antennerna är ljusare än resten av kroppen. Antennerna är kraftigt byggda och de sista lederna är utvidgade och bildar en tydlig klubba. De flesta *Atomaria*-arterna, som denna art, är mycket svårbestämbara och en säker artbestämning bör därför utföras av en specialist.

Utbredning och status

Känd från Dalarna, Jämtland, Ångermanland, Norrbotten och Pite lappmark. Närmast i Finland, vidare i Polen samt i Alperna i Österrike och Italien.

Ekologi

Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten påträffas under barken på gamla granstubbar och lågor med trädsvampar, särskilt klibbticka och violticka. Främst i gamla granbestånd med en rik frekvens av klibbtickor på döda stubbar och lågor.

Hot

Arten är knuten till mer eller mindre naturskogsliknande granskogar.

Åtgärder

Urskogsliknande granbestånd i norra och mellersta Sverige bör i största möjliga utsträckning avsättas som reservat.

Litteratur

Baranowski, R. 1980. Entomologisk inventering av Birtjärnsberget i Vansbro kommun sommaren 1978. *Länsstyrelsen i Kopparbergs län*.

Författare

Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.