



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Histeridae (stumpbaggar), **Släkte:** *Hypocaccus*, **Art:** *Hypocaccus dimidiatus* (Illiger, 1807) **Synonymer:** *Baeckmanniolus dimidiatus* (Illiger, 1807), *Pachylopus maritimus* (Stephens, 1830), *Saprinus maritimus* (Stephens, 1830)

Kännetecken

En långoval, svart art som är 4,5 mm lång. Benen är påfallande kraftigt byggda. Framskenbenen är försedda med långa tänder. På halsskölden finns ett punkterat fält på tvären bakom halsen. På varje täckvinge finns sex olika långa längsfårar. De två bakersta ryggsengeten sticker ut bakom täckvingarna.

Utbredning och status

Endast funnen i Halland, vid Träslöv 1972 och vid Laholm 1989. Den förekommer mycket sällsynt i Danmark och är i övrigt påträffad längs Mellan- och Sydeuropas kuster från Holland och Brittiska öarna till Portugal.

Ekologi

Ett rovdjur som påträffas på kadaver och i uppkastad tång på sandiga havsstränder. Livnär sig förmodligen framför allt av larver av andra insekter, såsom flugor och skalbaggar.

Hot

Artens livsmiljö är utsatt för mycket stark påverkan av badturism och annan exploatering. Badstränder rensas regelbundet från organiskt material såsom uppkastad tång och döda djur, vilket minskar tillgången på substrat.

Åtgärder

Exploatering av i första hand fyndlokalen men även andra lämpliga strandområden för exempelvis fritidshusbebyggelse och intensiv badturism, liksom förorening med spillolja bör i möjligaste mån undvikas.

Litteratur

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. *Ent Medd. XXXIII*: 195.
Koch, C. H. 1989. *Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 1*: 156. Krefeld.

Författare

Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.