



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Batrisodes*, **Art:** *Batrisodes hubenthali* Reitter, 1913 **Synonymer:**

Kännetecken

En rödbrun art med mörkare bakkropp. Den är 2 mm lång. Benen och antennerna är kraftigt byggda. De yttersta två antennlederna är kraftigt förlängda och bildar en tydlig klubba. På pannan finns två längsfårer, på halskölden finns tydliga fårer och upphöjningar. På varje täckvinge, som täcker halva bakkroppen, finns både en kort och en lång längsfåra. På första fria bakkroppsegmentet finns även två långa och två korta längsfårer. *Batrisodes*-arterna är svåra att skilja från varandra varför en specialist bör göra artbestämningen.

Utbredning och status

Känd från spridda landskap från Uppland till Lule lappmark. Närmast i Finland, ryska Karelen och Estland. Världsutbredningen sträcker sig från sydöstra Frankrike och norra Italien österut till Kaukasus

Ekologi

Lever i anslutning till myror, t.ex. av släktet *Lasius*, under bark och i lös ved av döda träd, såväl ek, alm, lönn, asp och barrträd. I Sverige är den påträffad hos *Lasius niger*, som ibland bygger sina bon i murkna träd.

Åtgärder

Gamla, mer eller mindre orörda bestånd med löv- eller blandskog inom förekomstområdena bör helst avsättas som reservat. Generellt gynnas arten av ökad lövträdsinblandning i bestånden, samt av att gamla träd sparas vid slutavverkningar.

Litteratur

- Baranowski, R. 1975. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 1. *Ent. Tidskr.* 96: 97–115.
- Baranowski, R. 1980. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 2. *Ent. Tidskr.* 101: 29–42.

Författare

Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.