



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Nära hotad (NT)  
B2b(iii)

**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Borboropora*, **Art:** *Borboropora kraatzii* Fuss, 1862 **Synonymer:** *Borboropora kraatzi* Fuss, 1862

## Kännetecken

En 1.8–2.5 mm lång kortvinge med långsmal, tillplattad kropp. Kroppen är glänsande svartbrun, täckvingar och ben ljusare brungula.

## Utbredning och status

Känd från Halland, Öland och Gotland (inklusive Gotska Sandön). Mycket få fynd, men arten är med stor sannolikhet starkt förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Ej känd från de övriga nordiska länderna eller Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och sträcker sig från Brittiska öarna till Ungern.

## Ekologi

Biologin är dåligt känd. Flera fynd är gjorda i jorden under kadaver på torra, öppna marker, t.ex. alvarmark och sandiga havsstränder. Det öländska fyndet gjordes vid bilhåvning. Också i Mellaneuropa är flertalet fynd gjorda på torrmarkslokaler med ett varmt lokalklimat.

## Hot

Artens status och eventuell hotbild är alldeles otillräckligt känd.

## Åtgärder

Arten bör inventeras och dess status fastställas.

## Litteratur

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. *Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20*.

## Författare

Håkan Ljungberg 2003. © ArtDatabanken, SLU 2006.