



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Curculionidae (vivlar), **Släkte:** *Brachytemnus*, **Art:** *Brachytemnus porcatus* (Germar, 1824) **Synonymer:**

Kännetecken

En 3–4 mm lång, svart vivel med långsträckt cylindrisk kropp. Snytet är avsmalnande mot spetsen.

Utbredning och status

Arten är noterad i naturliga habitat i Blekinge, östra Småland, Öland och Östergötland. Dessutom har den hittats i importerat virke i ytterligare ett par landskap (Gillerfors 1988). Arten har också införts till Danmark, men förekommer annars närmast i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till västra Asien (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologi

Larvutvecklingen sker i naturen i den hårda och torra splintveden på stående döda barrträd. Hos oss är arten dock främst påträffad i byggnadsvirke, gärna i flera hundra år gamla hus. Larvutvecklingen är troligen ettårig. De fullbildade skalbagarna stannar ofta kvar inne i veden, och kan påträffas under en stor del av året (Ehnström & Axelsson 2002, Rheinheimer et al. 2010).

Hot

Hotas av brist på gamla torrakor i skogslandskapet.

Åtgärder

Spara äldre barrträd vid avverkningar.

Litteratur

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU.
Gillerfors, G. (1988) Skalbaggar införda till Sverige med importerad massaved. Entomologisk Tidskrift 109, s.42-45
Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Författare

Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.