

# *Corticeus bicolor*

## Tvåfärgad barksvartbagge

Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Tenebrionidae (svartbaggar), **Släkte:** *Corticeus*, **Art:** *Corticeus bicolor* - tvåfärgad barksvartbagge (Olivier, 1790) **Synonymer:** *Hypophloeus bicolor* (Olivier, 1790)

### Kännetecken

En långsmal, cylindriskt byggd blanksvart art som är 4 mm lång. Främre delen av täckvingarna är skarpt färgade i gulbrunt. Antennerna är korta och enkelt byggda.

### Utbredning och status

Arten är känd från Skåne till Lule Lappmark, men med stora luckor i utbredningen. Utanför Sverige är den känd från de övriga nordiska länderna och Baltikum, samt från Kontinentaleuropa till Sibirien.

### Ekologi

Larvutvecklingen sker i gångarna av splintborrar, vanligen björksplintborre (*Scolytus ratzeburgi*) på döende björkar, främst i gamla hagmarker, men även andra splintborrearter på alm, och i Danmark även hos *Hylesinus crenatus* på ask. Detaljerna i artens näringsekologi är okända. *Corticeus*-arterna har tidigare ansetts vara rovdjur men är i huvudsak saprofager och svampätare som lever i gångarna hos olika vedinsekter (Español 1967), och endast uppträder som fakultativa predatorer.

### Hot

*C. bicolor* hotas främst av att grova, döende björkar avverkas för att användas till ved. Även bekämpningen av almsjukan är till skada för arten.

### Åtgärder

Lämna kvar döende björkar.

## Litteratur

---

- Ahnlund, H. & Lindhe, A. 1992. Hotade vedinsekter i barrskogslandskapet - några synpunkter utifrån studier av sörmländska brandfält, hållmarker och hyggen. *Ent. Tidskr.* 113: 13–24.
- Baranowski, R. 1980. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 2. *Ent. Tidskr.* 101: 29–42.
- Bergquist, Anders och Cewe, Tord. 1979. Nordvästra Munsö. Naturinventering som underlag för naturreservat och skötselplan. *Länstyrelsen i Stockholms län, 1979:12.*
- Jansson, A. 1927. Coleopterologiska bidrag. 16–18. *Ent. Tidskr.* 48: 207–228.
- Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. *Svensk Insektfauna Nr. 27.*
- Palm, T. 1950. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. *Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40:2.*
- Persson, Birger. 1950. Skalbaggar, hittade i Lycksele socken, ej upptagna för Lappland, i *Catalogus Coleopterorum Daniae et Fennoscandiae. Ent. Tidskr.* 71: 84–85.
- Pettersson, Roger. 1981. Entomologisk undersökning av urskogen på Vändåtberget. *Biologisk grundutbildning, rapportserie 1981:5.*
- Widenfalk, R. 1975. Skalbaggsfaunan i Strömsholm med angränsande områden. *Länstyrelsen i Västmanlands län 1975:17.*

## Författare

---

Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.