



Mörksömmad barksvartbagge



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Tenebrionidae (svartbaggar),
Släkte: *Corticeus*, **Art:** *Corticeus suturalis* - mörksömmad barksvartbagge (Paykull, 1800) **Synonymer:**
Hypophloeus suturalis (Paykull, 1800)

Kännetecken

En långsmal, cylindriskt byggd svart art som är 3,5 mm lång. Täckvingarna är bruna med ett svartbrunt ganska brett band som ligger runt suturen mellan täckvingarna. Antennerna är korta och enkelt byggda.

Utbredning och status

Utbredd från Skåne upp till Lule Lappmark med tyngdpunkten i norra Svealand och södra Norrland. I södra Sverige endast påträffad i Skåne, Småland och Västergötland. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från de östra delarna av Mellaneuropa österut till Japan.

Ekologi

Larvutvecklingen sker under barken på stående granar med angrepp av granbarkborren (*Ips typographus*). Detaljerna i artens näringsekologi är okända. *Corticeus*-arterna har tidigare ansetts vara rovdjur men är i huvudsak saprofager och svampätare som lever i gångarna hos olika barkborrar, och uppträder som fakultativa predatorer som ibland äter ägg och larver av barkborrar. Arten finns kvar åtminstone ett år efter att barkborrarna lämnat träden.

Hot

Det största hotet mot arten är den avverkning av döende granar som rutinmässigt genomförs av bland annat skogsskyddsskäl.

Åtgärder

Vid fynd av arten, i synnerhet i Sydsverige, bör om möjligt döende granar lämnas kvar i de aktuella bestånden.

Litteratur

- Baranowski, R. 1975. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 1. *Ent. Tidskr.* 96: 97–115.
- Baranowski, R. 1980. Entomologisk inventering av Birtjärnsberget i Vansbro kommun sommaren 1978. *Information från länsstyrelsen i Kopparbergs län.* 1980:5.
- Baranowski, R. 1980. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 2. *Ent. Tidskr.* 101: 29–42.
- Bruce, N. 1944. Några data från insamlingsresor för Riksmuseum jämte förteckning över nyfynd för land och landskap. *Ent. Tidskr.* 65: 9–28.
- Ehnström, B. 1963. Iattagelser över granskalbaggar i Västerdalarna. *Ent. Tidskr.* 84: 69–72.
- Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. *Svensk Insektfauna Nr.* 27.
- Palm, T. 1946. Coleopterfaunan i jämtländsk lavgranskog. I. Träd- och trädsvampfaunan. *Ent. Tidskr.* 67: 109–139.
- Sjöberg, O. 1928. För Sveriges fauna nya eller sällsynta Coleoptera huvudsakligen från det norrländska skogsområdet. *Ent. Tidskr.* 49: 115–125.
- Sjöberg, O. 1962. Coleoptera från Hälsingland och Hamra Kapellag. *Ent. Tidskr. suppl.* 2.

Författare

Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken , SLU 2006.