

# *Cryptocephalus bilineatus*

## Röllikfallbagge

Skalbaggar, Bladbaggar



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Nära hotad (NT)  
B2ab(iii)

**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Chrysomelidae (bladbaggar),  
**Släkte:** *Cryptocephalus*, **Art:** *Cryptocephalus bilineatus* - röllikfallbagge (Linnaeus, 1767) **Synonymer:**

### Kännetecken

En 2–3 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart, ben och antennernas bas gula. Huvudet är gult med svart teckning, halssköldens sidokanter gula och täckvingarna gula med svart söm och vardera ett svart längsband. Huvudet är starkt nedåtböjt och ovanifrån knappt synligt (detta är ett släktkännetecken för de s.k. fallbaggarna, *Cryptocephalus*). Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

### Utbredning och status

Utbredd från Skåne till Dalarna. Fynd efter 1985 finns spridda från hela utbredningsområdet. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Europa österut till Kina och Japan.

### Ekologi

Den fullbildade skalbaggen påträffas i blommor, särskilt prästkrage men också trift. Arten förekommer på såväl på torra och varma lokaler såsom alvarliknande buskmark eller torrare partier av älvstrandbrinkar, som på fuktigare lokaler som havsstrandängar. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända.

### Hot

Förekomsten på såväl fuktiga som torra, solexponerade ängsmarker gör att kraven är svåra att precisera. Både torrängar och fuktängar är dock starkt minskande i kulturlandskapet genom minskad slätter och betesdrift.

### Åtgärder

Arten bör eftersökas, och dess status samt habitatkrav klarläggas.

### Författare

Hans-Erik Wanntorp 2012.