



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Cypha*, **Art:** *Cypha apicalis* (Brisout de Barneville, 1863) **Synonymer:** *Hypocyptus nitidus* Palm, 1936, *Cypha nitida* (Palm, 1936)

Kännetecken

En 1–1,3 mm lång kortvinge med droppformad, välvd kroppsform. Svart eller brun med ljusare ben, halssköldens kanter och bakkroppsspetsen ljusare. Arten är mycket svårskild från flera närstående arter.

Utbredning och status

Funnen i spridda landskap från Skåne till Västerbotten. Närmast i Danmark och Norge. Världsutbredningen är begränsad till Europa.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad i eller i anslutning till äldre träd; dels vid gamla ihåliga ekar och bokar med myror (främst *Lasius brunneus*), dels i gnagmjöl av träfjäril (*Cossus cossus*) på ek och poppel. Dessutom är arten både i Sverige och Danmark påträffad inomhus, i gammalt höavfall i ridstall och i sädesmagasin.

Hot

Arten hotas av en minskning av äldre lövträd i skogs- och kulturlandskapet. I inomhusmiljöer är förbättrad hygien och ändrade byggnadsformer (betonggolv i stället för jordgolv i stallar o. likn.) ett hot.

Åtgärder

Skydda lokaler med äldre lövträd. Om möjligt bör man undvika att sanera det fåtal inomhuslokaler där arten ännu påträffas.

Litteratur

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera). *Ent. Tidskr.* 98: 11-28.
Palm, T. 1966. Kortvingar, häfte 4. *Svensk Insektfauna* 9. Stockholm.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.