

Dircaea australis

Orangefläckig brunbagge

Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Sårbar (VU)
B2ab(i,iii,iv)

Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Melandryidae (brunbaggar),
Släkte: *Dircaea*, **Art:** *Dircaea australis* - orangefläckig brunbagge Fairmaire, 1856 **Synonymer:**

Kännetecken

En 8–12 mm lång skalbagge med slank, spolformig kropp och långa ben. Svart, vardera täckvingen med två rödgula fläckar.

Utbredning och status

Endast påträffad i östra Småland. Saknas i de övriga nordiska länderna samt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till de östra delarna av Mellan- och Sydeuropa.

Ekologi

Larvutvecklingen sker i starkt vitrötad ved i stammar och grenar av olika lövträd, t.ex. ek, bok, björk, klibbal och rönn. Framför allt i ved angripen av svampar av släktet *Trametes*, gärna i gallrade stammar och grövre avverkningsavfall. Under 1960-talet tycktes arten gynnas lokalt av herbicidbehandling av lövträd på hyggen. Larvutvecklingen är tvåårig. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst i juni, ofta på stubbar av lövträd.

Hot

Arten hotas av den minskade mängden lövträd i skogsmark.

Åtgärder

Spara lövträd vid avverkningar, öka lövinslaget.

Naturvård

Åtgärdsprogram: Fastställt

Litteratur

Palm, T. 1950. Våra *Dircaea*-arter med särskild hänsyn till *D. australis* Fairm. (Col. Serropalpidae). *Opusc. Ent.* 15: 11–16.

Widenfalk, R. 1967. Anteckningar om svenska skalbaggar. 2. *Ent. Tidskr.* 88: 226–228.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005