



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Nitidulidae (glansbaggar), **Släkte:** *Epuraea*, **Art:** *Epuraea fuscicollis* (Stephens, 1835) **Synonymer:**

## Kännetecken

En bred, brun art med gula fläckar på täckvingarna. Den blir 3,5 mm lång. Täckvingarna har en påtagligt matt glans medan halsskölden är glänsande. Arten har kraftiga ben och de tre yttersta antennlederna bildar en tydlig klubba. Genom den stora likheten med *Epuraea guttata* bör arten bestämmas av en specialist.

## Utbredning och status

Känd från Skåne och Småland. Närmast i Danmark och i Estland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika österut till Iran.

## Ekologi

Biologin är dåligt känd. Arten påträffas vanligen vid savflöden på ek och björk, ofta i anslutning till angrepp av träfjärilen (*Cossus cossus*).

## Hot

Avverkning av skadade, savande ekar och björkar i parker, alléer och gamla betesmarker.

## Åtgärder

Hugg inte ned savande lövträd.

## Litteratur

Huggert, Lars. 1974. Anteckningar om Coleoptera. *Ent. Tidskr.* 95: 100–106.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der Süd- und Mittelschwedischen Laubbäume. *Opusc. Ent. suppl.* XVI.

## Författare

Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.