



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Nitidulidae (glansbaggar), **Släkte:** *Epuraea*, **Art:** *Epuraea longiclavis* Sjöberg, 1939 **Synonymer:**

Kännetecken

En rödbrun, platt och ganska bred art, som blir 3,5 mm lång. Täckvingarna är punkterade och har dessutom en fettartad glans. Den tydliga antennklubban är mera långsträckt än hos andra *Epuraea*-arter. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Utbredning och status

Känd från spridda landskap från Skåne till Norrbotten. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. I Norrland är arten funnen under barken på döda gråalar vid kanten av vattendrag och sjöstränder. Arten påträffas även i anslutning till andra lövträd och på sankängar.

Litteratur

Bruce, N. 1944. Några data från insamlingsresor för Riksmuseum jämte förteckning över nyfynd för land och landskap. *Ent. Tidskr.* 65: 9–28.

Gillerfors, G. 1982. Anteckningar om svenska coleoptera 2. *Ent. Tidskr.* 103: 73–77.

Palm, T. 1947. Anteckningar om svenska skalbaggar. III. *Ent. Tidskr.* 68: 171–178.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. *Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut* 40:2.

Författare

Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.