



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Euconnus*, **Art:** *Euconnus wetterhallii* (Gyllenhal, 1813) **Synonymer:** *Euconnus wetterhalli* (Gyllenhal, 1813)

Kännetecken

En 1,4–1,7 mm stor skalbagge med slank kropp och långa ben. Färgen är svart, ben och antenner är rödbruna.

Utbredning och status

Känd från spridda landskap från Småland till Uppland. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. Lever i förna på fuktig mark. På Öland bl.a. påträffad i ett betat extremrikkärr med tuvig axag och vegetationslösa, tidvis översvämmade kalkblekeytor. På Gotland är arten funnen på vegetationsfattig kalklera vid ett dräneringsdike. Arterna i familjen *Scydmaenidae* antas leva som rovdjur på kvalster.

Hot

Arten kan misstänkas vara missgynnad av utdikning samt av igenväxning av våtmarker p.g.a. upphörd hävd.

Åtgärder

Bibehåll beteshävd av rikkärr.

Litteratur

Ljungberg, H. 2005. Skalbaggar vid alvarvätar och rikkärr på Öland. *Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2005: 08*.

Sörensson, M. 1982. Inventering av insektsfaunan Muskmyr, Lergraven i Havdhem, Tjängvide, Hall Hangvar. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.