

Eudonia laetella

Vitt ugglemott

Fjärilar, Mott



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Lepidoptera (fjärilar), **Familj:** Crambidae, **Släkte:** *Eudonia*, **Art:** *Eudonia laetella* - vitt ugglemott (Zeller, 1846) **Synonymer:**

Kännetecken

Utbredning och status

Arten påträffas lokalt och mestadels enstaka i Skåne, Småland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Närke, Södermanland och Uppland. Den är känd från Norge och Finland, men uppträder även där mycket lokalt och fåtaligt. I Europa i övrigt saknas arten längst i väster för att bli vanligare mot öster och söder.

Ekologi

Larven uppges leva av mossor på trädstammar och tak i mars–maj. Fjärilen påträffas mest i äldre lövskog, huvudsakligen i juli.

Hot

Sannolikt är kalavverkning av äldre lövskog liksom hårdexploatering av lokalerna skadligt för arten.

Åtgärder

Äldre lövskog bör bevaras så långt möjligt. Större förändringar på kända lokaler bör undvikas. Mer forskning beträffande artens levnadsvillkor och förekomst behövs.

Litteratur

Hannemann, H.-J. 1964. Die Wickler (s.l.) (Cochylidae und Carposinidae), Die Zünslerartigen (Pyralidoidea). *Die Tierwelt Deutschlands*, 50. Teil.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. *Danmarks Dyreliv Bind 3*.

Svensson, I. 1994. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1993. *Ent. Tidskr.* 115: 45–52.

Författare

Ingvar Svensson 1997.