



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Eucnemidae (halvknäppare),  
**Släkte:** *Microrhagus*, **Art:** *Microrhagus emyi* (Rouget, 1856) **Synonymer:**

## Kännetecken

En långsmal svart skalbagge som är 4 mm lång. Antennerna är mycket kraftiga och hos hanen sågtandade. På den kullriga halsskölden är bakhörnen utdragna som vassa spetsar. Skenben och fötter är färgade i rostrött.

## Utbredning och status

I Norden endast känd från Bohuslän (Lindön 1963) och två lokaler på mellersta Öland (1974, 2008). De närmaste fyndplatserna ligger i Bayern och f.d. Tjeckoslovakien. I övrigt är den känd från Österrike och vissa områden i Sydeuropa och Kaukasus.

## Ekologi

Lever i svampiga grenar av olika lövträd, inklusive hasselstammar. I Sverige är arten funnen vid bankning av hasselbuskar.

## Hot

Arten är starkt hotad eftersom den troligen endast finns inom mycket begränsade områden. Alltför kraftiga röjningar kan missgynna den.

## Åtgärder

Halltorpsreservatet bör snarast utvidgas för att gynna såväl *M. emyi* som ett stort antal andra hotade arter. Vid försiktiga röjningar runt de gamla ekarna är det viktigt att fortsätta spara riset på samma sätt som skett under senare år.

## Litteratur

Lundberg, S. 1975. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 15 (Coleoptera). *Ent. Tidskr.* 96: 8–13.

## Författare

Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström & Stig Lundberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.