



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Microscydmus*, **Art:** *Microscydmus nanus* (Schaum, 1844) **Synonymer:** *Euconnus nanus* (Schaum, 1844)

Kännetecken

En 0,9 mm stor skalbagge med slank kropp och långa ben. Färgen varierar från rödgul till mörkbrun, ben och antenner är gula.

Utbredning och status

Funnen i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Känd från alla våra grannländer samt Baltikum. Världsbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet och Kaukasus.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. Påträffas ofta i murken ved eller under bark av lövträd som bok eller ek, men också i markförna i skogsmark. I Danmark är arten funnen i mossa på stubbar, i barrträdsstubbar och vid sållning av granbarr, samt hos myror av släktet *Formica*. Arterna i familjen *Scydmaenidae* antas leva som rovdjur på kvalster. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst vår och höst.

Hot

Arten kan bl.a. antas vara missgynnad av att andelen gamla lövträd minskar i skogslandskapet, och att gamla skadade träd gallras bort i odlingslandskapet.

Åtgärder

Avsätt äldre skogsbestånd för fri utveckling. Spara äldre lövträd i parker, betesmarker och alleer.

Litteratur

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40: 2.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.