



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Nationellt utdöd (RE)

Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Monotomidae (gråbaggar), **Släkte:** *Monotoma*, **Art:** *Monotoma quadrifoveolata* Aubé, 1837 **Synonymer:**

Kännetecken

En rödbrun, långsträckt skalbagge som är 2 mm lång. Den långsträckta halsskölden har små tänder på sidorna. På täckvingarna syns fina längsrader med punkter och borst. På varje sida mitt på halsskölden finns en djup fåra. Varje fåra består av två gropar som är förenade med varandra. De två yttersta antennlederna bildar en tydlig klubba.

Utbredning och status

Påträffad i Skåne, Halland och Västergötland. Inga sentida fynd är kända. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika österut till Kina. Arten är även spridd med mänskliga transporter till andra världsdelar.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. Arten påträffas oftast synantropt i ruttnande växtdelar; i komposter, lador (i synnerhet med sorkförekomster) och stall. Dessutom är den, bland annat i Danmark, funnen under granbark och kläckt ur barrved.

Hot

Förbättrad hygien i och kring gårdar.

Åtgärder

Avstå om möjligt från genomgripande miljöförändringar på eventuella fyndlokaler.

Litteratur

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. *Ent Medd. XXXIII*: 257.
Koch, C. H. 1989. *Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 2*: 168. Krefeld.

Författare

Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.