



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Mycetoporus*, **Art:** *Mycetoporus brucki* (Pandellé, 1869) **Synonymer:** *Mycetoporus laevicollis* Eppelsheim, 1878, *Mycetoporus bruckii* (Pandellé, 1869)

Kännetecken

En 4–5 mm lång kortvinge med slank, spolförmig kropp. Svart eller brun, halssköldens kanter, täckvingarna och bakkroppsledningarnas bakkanter rödbruna.

Utbredning och status

Endast tre svenska fynd är kända: från Närke (Almby 1921), Uppland (Vänge, Fiby urskog 1946) och Värmland (Lundsberg 1938). Arten kan misstänkas vara till viss del förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Närmast i Norge och Finland. Världsutbredningen är dåligt känd p.g.a. oklarheter i nomenklaturen.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. De svenska fynden är gjorda vid förnasällning, bl.a. av barrförna, av lövförna vid en sjöstrand, av mossa och löv på stubbar vid en sank bäckstrand och i tuvor i en översvämmad gran-klibbalsumpskog.

Hot

Hotsituationen är svårbedömd. De få fynden tyder dock på att arten ställer höga krav på substrat och livsmiljö. Arten kan misstänkas vara hotad av utdikning och slutavverkningar av sumpskogar och andra fuktiga skogsbestånd.

Åtgärder

Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Litteratur

Palm, T. 1966. Kortvingar, häfte 4. *Svensk Insektfauna* 9. Stockholm.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.