



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Philonthus*, **Art:** *Philonthus corruscus* (Gravenhorst, 1802) **Synonymer:** *Philonthus coruscus* (Gravenhorst, 1802)

Kännetecken

En 7–8 mm lång kortvinge med långsträckt spolförmig kropp. Svart, täckvingar röda.

Utbredning och status

Påträffades som ny för landet vid Degeberga i östra Skåne 1977 och 1978. Några senare fynd är ej kända, men arten kan misstänkas vara till viss del förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Närmast i Danmark, där arten är utbredd men sällsynt, samt i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Afghanistan och västra Sibirien.

Ekologi

Ett rovdjur, som i Mellaneuropa påträffas i spillning och as samt i djurbon på öppna marker såsom ängar, skogskanter och öppna tallhedar. Larvutvecklingen sker förmodligen underjordiskt i bon av olika däggdjur (räv, grävling, kanin, mullvad). De svenska fynden är gjorda i eller i nära anslutning till kaningångar i en sydvänd sandslänt med stäppartad torrängsvegetation. Fullbildade individer har i Sverige påträffats i maj och september.

Hot

De svenska fynden är gjorda i en naturtyp som hotas av igenväxning p.g.a. upphörd hävd.

Åtgärder

Vidmakthåll hävden av de östskånska sandmarkerna. Arten bör dessutom eftersökas, och dess status klarläggas.

Litteratur

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 2 (Coleoptera). *Ent. Tidskr.* 98: 133-140.
Baranowski, R. 1979. Skalbaggar som lever i kaningångar. *Ent. Tidskr.* 100: 57-60.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.