


# Poecilonota variolosa

## Asppraktbagge

Skalbaggar, Praktbaggar



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Buprestidae (praktbaggar), **Släkte:** *Poecilonota*, **Art:** *Poecilonota variolosa* - asppraktbagge (Paykull, 1799) **Synonymer:** *Descarpentriesina variolosa* (Paykull, 1799), *Buprestis variolosa* Paykull, 1799

### Kännetecken

En 13-21 mm lång skalbagge med långsträckt oval kroppsform. Svart med grönt eller kopparfärgat metallskimmer, översidan marmorerad.

### Utbredning och status

Utbredd från Skåne till Norrbotten med undantag för några få landskap. Nominatformen är känd från Norge, Finland och Baltikum, vidare utbredd från Europa österut till Mongoliet och östra Sibirien. I Ostasien representeras arten av andra underarter.

### Ekologi

Larvutvecklingen sker i grov, levande bark på solexponerade aspar. Främst angrips de basala delarna av grova aspar utmed vägkanter, i hagmarker, utefter älvstränder eller på hyggen. De flesta angreppen sker från markytan och upp till 5 dm höjd på stammarna, men i samband med äldre sårskador kan angreppen omfatta flera meter av den nedre delen av stammen. Angreppen finns nästan uteslutande på stammens mest solexponerade delar. Ibland kan blottade, grövre rötter på ganska långt avstånd från stammen angripas. Normalt sker förpuppningen i de grövre barkåsarna. Larvutvecklingen tar ofta mer än två år. Den nykläckta skalbaggen visar sig från slutet av maj till mitten av september.

### Naturvård

**Konventioner:** Skogsstyrelsens signalart

### Författare

Håkan Ljungberg 2015