



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Nationellt utdöd (RE)

Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Chrysomelidae (bladbaggar),
Släkte: *Psylliodes*, **Art:** *Psylliodes attenuata* (Koch, 1803) **Synonymer:** *Psylliodes attenuatus* (Koch, 1803)

Kännetecken

En 1,8–2,6 mm lång jordloppa med äggrund kropp och kraftiga hoppben. Kroppen är svart med grönaktig eller mässingsfärgad metallglans, täckvingarna mot spetsen liksom ben och antenner rödaktiga. Arten är svår att bestämma och bestämningen måste därför granskas av en specialist.

Utbredning och status

Humlejordloppan är från Sverige endast känd genom ett antal exemplar som insamlades på Öland under 1800-talet (utan närmare lokaluppgift). Arten är också rapporterad från Finland och i Baltikum. Världsutbredningen omfattar större delen av Palearktisk, från Europa till Japan.

Ekologi

Lever på arter av familjen Cannabaceae, i Mellaneuropa såväl humle, *Humulus lupulus*, som hampa, *Cannabis sativa*. Larven utvecklas vid växtens rötter under sommaren. Fullbildade individer uppträder dels i juli-augusti, dels efter övervintring i maj, då fortplantning och äggläggning äger rum. I Mellaneuropa har arten stundtals uppträtt som skadedjur.

Hot

Det är inte otänkbart att arten förekom i Sverige när humleodlingen var mera utbredd. Kanske finns arten ännu kvar, då värdväxten ännu är ganska vanlig.

Åtgärder

Arten är sannolikt försvunnen från landet, men bör eftersökas.

Författare

Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.