



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Histeridae (stumpbaggar), **Släkte:** *Saprinus*, **Art:** *Saprinus rugifer* (Paykull, 1809) **Synonymer:**

## Kännetecken

En 4–5 mm lång, brett oval och starkt välvd skalbagge. Översidan är svart. Benen är kraftiga, skenbenen är breda och platta och försedda med korta tänder på utsidan. Antennernas yttersta leder bildar en tydlig klubba. Täckvingarna har en mycket grov och tät, rynkigt sammanflytande punktur, med endast en fläck framtill vid skutellen glatt och spegelblank. Arten kan fälla in ben och antenner i fåror på kroppens undersida om den störs. De två sista rygglederna täcks ej av täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

## Utbredning och status

Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Södermanland, Uppland och Västmanland. Sentida fynd är endast kända från Skåne, men arten kan delvis vara förbisedd. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till västra Sibirien.

## Ekologi

Larvutvecklingen sker i bon av backsvala, där arten lever som ett rovdjur på larver av andra insekter. Den fullbildade skalbaggen är även den ett rovdjur, och påträffas även utanför bona, t.ex. på kadaver. Ofta vid havet, t.ex. i eroderade kustkrintar. I Skåne är arten bl.a. funnen i backafall vid Öresundsstranden (Ven och Glumslöv).

## Hot

Med nuvarande kunskapsläge är artens status och hotsituation svårbedömd.

## Åtgärder

Arten bör eftersökas, och dess status klarläggas. Branter med backsvalekolonier bör bevaras och med lämpliga åtgärder skyddas från igenväxning. Täckrestaurering som ödelägger erosionsbranter genom igenschaktning och avsläntning bör undvikas.

## Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.