

Vincenzellus ruficollis

Rödhuvad trädbasbagge

Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)



NE NA LC DD NT **VU** EN CR RE

Sårbar (VU)
B2ab(iii)

Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Salpingidae (trädbasbaggar), **Släkte:** *Vincenzellus*, **Art:** *Vincenzellus ruficollis* - rödhuvad trädbasbagge (Panzer, 1794) **Synonymer:** *Vincenzellus viridipennis* (Latreille, 1804)

Kännetecken

En 2,5–3,5 mm lång skalbagge. Kroppen är skarpt tvåfärgad med huvud, halssköld och ben gulröda medan täckvingarna är svartblå. Halsskölden är hjärtformad och huvudet är starkt förlängt framåt. Täckvingarna är försedda med långsgående punktrader.

Utbredning och status

Endast känd från Öland. Flertalet fynd är gjorda i Halltorps hage. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.

Ekologi

Larvutvecklingen sker under bark på döda grenar av olika lövträd, t.ex. avenbok, hassel och hagtorn. Såväl larver som fullbildade skalbaggar är rovdjur som lever av barkborrar. Arten är ofta påträffad i avverknings- eller röjningsavfall.

Hot

Avverkning av döende lövträd. Avlägsnande av ris, till exempel för flisproduktion eller av ren "städdiver".

Åtgärder

Avstå från att avverka döende lövträd. Städa ej bort riset efter till exempel naturvårdsröjningar, utan lämna kvar det i högar.

Litteratur

Andersson, Bengt. 1981. Notiser om svenska skalbaggar 3. *Ent. Tidskr.* 102: 141–146.
Bruce, N. 1944. Några data från insamlingsresor för Riksmuseum jämte förteckning över nyfynd för land och landskap. *Ent. Tidskr.* 65: 9–28
Lundberg, S. 1981. Sällsynta skalbaggar i Halltorps hage. *Ent. Tidskr.* 102: 135–137.

Författare

Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.