



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Ptinidae (trägnagare), **Släkte:** *Xyletinus*, **Art:** *Xyletinus laticollis* (Duftschmid, 1825) **Synonymer:**

Kännetecken

En 3–4 mm lång skalbagge med starkt välvd, kort cylindrisk kropp och sågtandade antenner. Huvudet kan dras in under kroppen och är då inte synligt rakt uppifrån. Kroppen är svart och svagt glänsande. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Utbredning och status

Påträffad i Halland, Småland, Östergötland och Västergötland. Mycket få sentida fynd är kända, men arten kan möjligen vara förbisedd. Närmast i Danmark, Norge, Estland och Lettland. Världsbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika österut till östra Ryssland.

Ekologi

Larvutvecklingen sker i hård saltorkad spillning på sandmark, främst i kustområden. Arten är bl.a. funnen på färbeatad mark i Göteborgs skärgård.

Hot

Exploatering av sanddynsområden i kombination med minskat bete.

Åtgärder

Upprätthåll betesdriften på sandstränder och torrängar och förhindra i görligaste mån att de exploateras på annat sätt.

Litteratur

Lundberg, S. 1991. De svenska *Xyletinus*-arterna (Coleoptera, Anobiidae). *Ent. Tidskr.* 112: 101–105.

Författare

Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.