


Nephrotoma croceiventris

Mörk strimharkrank



NE NA LC DD NT **VU** EN CR RE

Sårbar (VU)
B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Diptera (tvåvingar), **Familj:** Tipulidae (storharkrankar), **Släkte:** *Nephrotoma*, **Art:** *Nephrotoma croceiventris* - mörk strimharkrank (Strobl, 1909) **Synonymer:**

Kännetecken

Mörk strimharkrank är tecknat i gult och svart. Bakkroppen är blåsvart med gula fläckar på sidor likt den närliggande arten *Nephrotoma pratensis*. Karaktärer som utmärker mörk strimharkrank är att området mellan ögonen och under antennfästena är brunt, och att mellankroppens mörka sidoränder är matta. Arten är mycket lik *N. pratensis*, och kan säkrast separeras från den och närliggande arter genom studier av bakkroppsspetsens (hypopygium).

Utbredning och status

Mörk strimharkrank är i Sverige känd från tre lokaler i Skåne (Ystad 1912, Genarp 1935, Degeberga 1960). Arten är ej funnen i de övriga Nordiska länderna, annars är arten utbredd över stora delar av Europa. Arten är sällsynt i hela sitt utbredningsområde.

Ekologi

Artens biologi är dåligt känd men är i Europa funnen på sandmarker (Holland), översvämmade gräsmarker, och längs sjöar och vattendrag (Oosterbroek & de Jong, 2001). Larven är troligtvis marklevande och saprofag likt närbesläktade arter.

Hot

Har troligen liten tolerans för ändrade miljöförhållanden.

Åtgärder

Arten bör eftersökas, i första hand vid Degeberga där den senast är påträffad. Bättre kunskap behövs om artens biologi.

Litteratur

Catalogue of Craneflies of the World, Oct 2005 <http://ip30.eti.uva.nl/ccw/>

Lindner, E. 1980. *Die Fliegen der paläarktischen Region Band III:5. 15 Tipulidae*. E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart.

Oosterbroek, P. & de Jong, H. 2001. New data on Tipulidae (Diptera) from the Netherlands. *Entomologische Berichten* 61: 101–114.

Författare

Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.