



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Nationellt utdöd (RE)

Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Ptiliidae (fjädervingar), **Släkte:** *Actinopteryx*, **Art:** *Actinopteryx fucicola* (Allibert, 1844) **Synonymer:**

Kännetecken

En mycket liten (0,75–0,85 mm lång), svart och välvd art. Halsskölden är bredare än täckvingarna. Översidan är täckt av en mycket tät, nedliggande behåring.

Utbredning och status

Känd genom ett 1800-talsfynd från Trelleborg i sydvästra Skåne. Närmast i Danmark (Falster), vidare i Holland och längre söderut längs Västeuropas kust. Inga sentida fynd i Sverige eller Danmark. Världsutbredningen omfattar för övrigt tropiska och subtropiska delar av Atlantens kuster (även i Nordamerika och Västindien), Medelhavet, Svarta havet och Indiska Oceanen.

Ekologi

Lever i ruttnande tångvallar på havsstränder.

Hot

Närmare anledning till artens försvinnande är ej känt. Tänkbara hot kan vara olika typer av exploatering som drabbat artens livsmiljö på havsstränder samt olika typer av föroreningar.

Åtgärder

Arten är med all sannolikhet försvunnen från landet.

Litteratur

Sörensson, M. 2000. New Swedish records of Feather-wing beetles (Coleoptera, Ptiliidae), and a discussion of two regionally extinct species. *Ent. Tidskr.* 121: 181–188.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.