



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Gabrius*, **Art:** *Gabrius bescidicus* Smetana, 1954 **Synonymer:**

Kännetecken

En 4,5–5 mm lång kortvinge med slank, spolförmig kropp. Svartbrun med ljusare ben. Arten är mycket svårskild från närstående arter, och bestämningen måste granskas av en specialist.

Utbredning och status

Känd från några glest spridda lokaler i Norrbotten, Åsele och Pite lappmark. Närmast i Finland. Utanför Norden är arten endast känd från Tjeckien.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. Artens närmaste släktingar lever under barken på döda träd. Svenska fynd är gjorda vid sällning av mossa, i anslutning till granris i en myrkant och i en fönsterfälla i urskogsartad tallskog.

Hot

Artens status och hotsituation är svårbedömda utifrån nuvarande kunskap.

Åtgärder

Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Litteratur

Lundberg, S. 1966. Något om skalbaggsfaunan inom Reivo-reservatet. *Opusc. Ent.* 31: 33–38.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.