



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Nitidulidae (glansbaggar), **Släkte:** *Meligethes*, **Art:** *Meligethes lugubris* Sturm, 1845 **Synonymer:**

Kännetecken

En 1,6–2,2 mm lång, oval, svagt välvd brunsvart skalbagge. De mörka benen är korta med plattade lår och skenben. Framskenbenen är kraftigt och oregelbundet sågtandade på utsidan. Antennerna är mörka med en oval klubba. Arterna i släktet är mycket svårbestämbara och identifieringen måste bekräftas av en specialist.

Utbredning och status

Säkert belagda fynd finns från Skåne, östra Småland, Öland och norra Östergötland (Kolmården). Efter 1985 finns enstaka fynd från Öland och Skåne. Äldre uppgifter om fynd från de flesta landskap från Skåne till Värmland och Dalarna har visat sig bero på förväxling med den mycket närstående *M. gagatinus*. Den krypande värdväxten gör att arten är svårsamlad, och den kan därför möjligen vara till viss del förbisedd. Arten är rapporterad från alla våra grannländer utom Norge, men även i grannländerna kan arten delvis ha förväxlats med myntapollenbaggen. Världsbredningen sträcker sig från Västeuropa till östra Ryssland.

Ekologi

Larvutvecklingen sker i blommorna av timjan, hos oss troligen backtimjan (*Thymus serpyllum*). På varma, öppna torrmarker med lågväxt vegetation. Även de fullbildade skalbagarna påträffas i värdväxtens blommor.

Hot

Hotet mot arten är värdväxternas försvinnande. På grund av det generellt minskade betetrycket särskilt i torra naturbetesmarker har timjan minskat starkt i hela sitt utbredningsområde under de senaste 50 åren.

Åtgärder

Artens nuvarande status bör undersökas genom riktat sök på värdväxten. Bete i torra, soliga naturbetesmarker bör gynnas eller återupptas för att gynna värdväxten.

Litteratur

Audisio, P. 1993. Coleoptera Nitidulidae-Kateretidae. Edizioni Calderini, Bologna.

Författare

Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.