

# *Cicindela hybrida*

## Brun sandjägare

Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Carabidae (jordlöpare), **Släkte:** *Cicindela*, **Art:** *Cicindela hybrida* - brun sandjägare Linnaeus, 1758 **Synonymer:**

### Kännetecken

---

12-16 mm. Mest lik *C. maritima*, och ibland svår att skilja från denna. Oftast ljust chokladbrun (hanen mörkare), ibland med dragning åt grönt. Överläpp ljus. Täckvingarnas ljusa tvärband varierar men är oftast bredare och mindre vinkelböjt än hos *C. maritima*. Säkrast skiljs arterna åt på att huvudet hos *C. hybrida* endast har några enstaka borst innanför ögats bakkant. Fullbildade larver har svagt metallisk framkropp, och ca 40-80 borst på halssköldens ovansida.

### Utbredning och status

---

Utbredd och ganska vanlig i Götaland och sydvästra Svealand. Sentida nyfynd i Närke, Södermanland och Värmland antyder att arten kan vara stadd i spridning mot nordost.

### Ekologi

---

På öppen, torr sandmark med gles vegetation. På flygsandfält och sandgräshedar, i grå dyner, i sandtäckter, även i nipor och torrare partier av älvstränder. Larvgångarna anläggs i ren, torr sand. Fullbildade skalbaggar påträffas främst under försommaren, men också på sensommaren.

### Författare

---

Håkan Ljungberg 2016.