

Donacia antiqua

Bronsrörbock

Skalbaggar, Bladbaggar



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Kunskapsbrist (DD)

Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Chrysomelidae (bladbaggar),
Släkte: *Donacia* (rörbockar), **Art:** *Donacia antiqua* - bronsrörbock Kunze, 1818 **Synonymer:**

Kännetecken

Längd 7-9 mm. Kropp med mörkt koppar- eller bronsfärgad metallglans, påfallande blank p.g.a. den glesa punkturen. Ben och antenner enfärgat metalliska. Täckvingarna med bucklor inte bara längs sömmen utan också i yttre hälften, liksom hos *D. bicolora*. Baklår med en kraftig tand.

Utbredning och status

Känd från Norrbotten. Först påträffad på 1970-talet, och ett riktat eftersök har visat att arten är utbredd längs flera vattendrag. Den kan mycket väl visa sig ha en större utbredning i Norrland. Utbredd i Finland och Baltikum, men saknas i Norge och Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Nord- och Östeuropa till västra Sibirien. Många äldre uppgifter om förekomst beror dock på sammanblandning med *D. brevitarsis*.

Ekologi

Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av starr (*Carex*), främst i rinnande vatten. I Norrbotten är arten funnen på norrlandsstarr (*Carex aquatilis*) vid forsande eller snabbt rinnande, små eller medelstora åar med sandig botten. Vid mer lugnflytande vattendrag med kärriga stränder tycks arten ersättas av andra bladbockar. I Finland är arten funnen på starr växande på siltig sandbotten nedströms en sandrevel i en älv, men också vid sjöstränder. Den fullbildade skalbaggen äter pollen och påträffas främst under maj-juni, vanligen sittande på starr.

Hot

Artens status är osäker och eventuella hot är oklara, men den påverkas troligen negativt av vattenreglering.

Åtgärder

Artens utbredning och status behöver klarläggas genom riktade eftersök på fler lämpliga lokaler i norra Sverige.

Författare

Hans-Erik Wanntorp 2015. Rev. Håkan Ljungberg 2017.