



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Hemiptera (halvvingar), **Familj:** Delphacidae (sporrstritar), **Släkte:** *Achorotile*, **Art:** *Achorotile longicornis* (Sahlberg, 1871) **Synonymer:**

Kännetecken

En relativt liten strit, ca 3 mm lång. Vanligtvis kortvingad. Liknar mycket den närbesläktade arten *A. albosignata*. Särskiljes bäst på antennernas utseende och genitalerna, se bilder i Ossinaniilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.

Utbredning och status

I Sverige finns endast ett fåtal fynd, dels två från norra Norrland båda från 1952 och ett i från Gävleborgs län 1988. Finland har liknande fyndhistorik med två äldre fynd och ett mera sentida (1984). I övrigt utbredd i Frankrike, Tyskland, Polen och österut i Ryssland. Arten är rödlistad som EN i Finland (2010).

Ekologi

Arten lever på sandig, stenig mark. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter, värdväxten är sannolikt gräset bergven, *Agrostis vineale*. I Alperna har arten fångats på klynnetåg, *Juncus trifidus*. Adulter är funna i juli-augusti. Arten övervintrar sannolikt i äggstadiet.

Hot

Inget direkt hot är känt mot arten.

Åtgärder

Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Litteratur

Holzinger, W.E., Kammerlander, I. & Nickel, H. 2003. *The Auchenorrhyncha of Central Europe 1. Fulgoromorpha, Cicadomorpha excl. Cicadellidae*. 1-673. Brill, Leiden.

Ossinaniilsson, F. 1978. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark – *Fauna Entomologica Scandinavica* 7:1, 1-222.

Söderman, G. 2007. *Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha)*. The Finnish Environment 7/2007, Finnish Environment Institute.

Författare

Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.