



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Starkt hotad (EN)  
A2c

**Klass:** Dothideomycetes, **Ordning:** Capnodiales, **Familj:** Mycosphaerellaceae, **Släkte:** Ramularia (bladfläcksmögel), **Art:** *Mycosphaerella chimaphilae* (Ellis & Everh.) Höhn. **Synonymer:** *Sphaerella chimaphilae* Ellis & Everh., *Sphaeria pyrolae* Ehrenb.:Fr., *Depazea pyrolae* (Ehrenb.:Fr.) Sacc., *Depazea pyrolae* Ehrenb.:Fr., *Stigmatea pyrolae* (Ehrenb.:Fr.) J.Schröt., *Stigmatea pirolae* (Ehrenb.:Fr.) J.Schröt., *Mycosphaerella pyrolae* (Ehrenb.:Fr.) B.Erikss.

## Kännetecken

---

De små svarta perithecierna syns som prickar på levande blad av ryl. Dessa producerar avlånga sporsäckar som innehåller tvåcelliga hyalina spolförmiga sporer.

## Utbredning och status

---

Svenska fynd finns från Skåne i söder till Västmanland i norr, inklusive från Gotland.

## Ekologi

---

Arten är parasit på ryl som huvudsakligen förekommer i glesa tallskogar på hållmarker och väl-dränerade mineraljordar.

## Hot

---

Den totala populationen i landet bedöms ha minskat p.g.a. en pågående populationsminskning av värdväxten.

## Åtgärder

---

Svampen bör eftersökas och rika ryl-lokaler bör bevaras.

## Övrigt

---

Artens taxonomiska ställning är något oklar.

## Litteratur

---

Aptroot A. 2006. *Mycosphaerella* and its anamorphs: 2. Conspectus of *Mycosphaerella*. - CBS Biodiversity Series.

## Författare

---

Björn Nordén 2012