



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Aleochara*, **Art:** *Aleochara lygaea* Kraatz, 1862 **Synonymer:**

Kännetecken

En 3–4 mm lång kortvinge med bred, spolförmig kropp. Svart, täckvingar baktill ljusare, antennbas och ben rödbruna.

Utbredning och status

Påträffad i Skåne, Halland, Småland och Västergötland. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till östra Sibirien och Kina.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. I Sverige är arten främst funnen vid savflöden i gamla lövträd, bl.a. i samband med angrepp av träfjäril i asp och poppel. I Danmark är den funnen under samma omständigheter, men undantagsvis också i gångar av smågnagare, i lövförna, i ruttande svamp och i spillning. Flera (möjligen alla) arter i släktet *Aleochara* utvecklas som parasitoider på flugor. Larvutvecklingen sker troligen under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas dels under våren-försommaren, dels under sensommaren-hösten.

Hot

Status och hotsituation är svårbedömda utifrån nuvarande kunskap. Arten kan dock antas vara missgynnad av att gamla skadade träd gallras bort i parker och i odlingslandskapet.

Åtgärder

Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Litteratur

Palm, T. 1953. För Sverige nya Coleoptera. XIII. Ent. Tidskr. 74: 130–136.
Palm, T. 1972. Kortvingar, häfte 7. *Svensk Insektfauna* 9. Stockholm.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.