

Amblytylus albidus

Borsttåtelskinnbagge

Halvingar, Skinnbaggar



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Hemiptera (halvvingar), **Familj:** Miridae (ängsskinnbaggar), **Släkte:** *Amblytylus*, **Art:** *Amblytylus albidus* - borsttåtelskinnbagge (Hahn, 1834) **Synonymer:**

Kännetecken

Borsttåtelskinnbaggen är en långsmal ängsskinnbagge. Släktet *Amblytylus* skiljs från andra släkten genom att huvudet är utdraget framtill. Ovansidan är vitaktig till ljus rosa-brun, med tät och fin behåring. Halskölden har breda, bruna längsränder som fortsätter ut på täckvingarna. Benen är ljusgula med mörka tarser. Antennerna är rödbruna med mörkare 4:e led. Vål kamouflagerad på sina värdväxter. Kroppslängd 5–6 mm.

Utbredning och status

Borsttåtelskinnbagge är i Sverige funnen i Skåne (flera lokaler), Blekinge, och Öland. Arten har sin nordligaste utbredning i södra Sverige, annars utbredd över större delen av Europa bort mot Svarta havet. Är närmast funnen i Danmark. Betraktas som lokalt vanlig i tex Tyskland.

Ekologi

Ängsskinnbaggar livnär sig generellt på att suga ut blad, stjälkar, frukter. Borsttåtelskinnbaggen är funnen på sandiga lokaler på gräsarter som losta (*Bromus*) och borsttåtel (*Corynephorus canescens*). Typiska biotoper för arten är sandhedar och dyner. Övervintrar som ägg. Nymfer ses på våren och aduler i juli-augusti.

Hot

Borsttåtelhedar har minskat kraftigt genom igenplantering och exploatering för sommarstugebebyggelse. De degenererar även pga kväve-nedfall som stimulerar igenväxning.

Åtgärder

Artens utbredning och status bör följas noga.

Litteratur

Gaun, S. 1974. Blomsteræger. Danmarks Fauna 81. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.
Skipper, L.: Danmarks blomstertæger. 2013. Apollo booksellers. 1-407.
Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschlands 75: 1-294.

Författare

Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.