



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Atheta*, **Art:** *Atheta autumnalis* (Erichson, 1839) **Synonymer:**

Kännetecken

En 2–2,5 mm lång kortvinge med spolförmig kropp. Svart, täckvingar svartbruna, antennbas och ben rödgula. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.

Utbredning och status

Känd från Södermanland, Härjedalen, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten. Närmast känd från Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen är förmodligen knuten till trädsvampar eller svampangripen bark. Arten påträffas framför allt under blöt bark på döda träd, främst gran, som delvis ligger i vatten.

Hot

Hotsituationen är svårbedömd. De få fynden tyder dock på att arten ställer höga krav på substrat och livsmiljö.

Åtgärder

Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Litteratur

Huggert, Lars. 1974. Anteckningar om Coleoptera. *Ent. Tidskr.* 95: 100–106.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.