



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Atheta*, **Art:** *Atheta liturata* (Stephens, 1832) **Synonymer:**

Kännetecken

En 2–2,7 mm lång kortvinge med spolförmig kropp. Svart eller brunsvart, täckvingar och ben ljusare. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.

Utbredning och status

Känd från Skåne, Öland, Västergötland, Uppland, Västmanland och Gästrikland. Sentida fynd finns från Västergötland (Kinnekulle), Västmanland (Strömsholm) och Uppland (Båtforsområdet). Närmast känd från Danmark och Baltikum. Världsbredningen är begränsad till Europa.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i eller i anslutning till ruttnande trädsvampar på gamla ädellövträd. Fullbildade skalbaggar är främst funna på svavel- och fjällticka i äldre lövträdsbestånd. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst under högsommaren.

Hot

Hotsituationen är svårbedömd. De få fynden tyder dock på att arten ställer höga krav på substrat och livsmiljö. Arten hotas genom en allt större brist på gamla skadade ädellövträd med trädsvampar.

Åtgärder

Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Litteratur

Palm, T. 1942. Coleopterfaunan vid Nedre Dalälven. *Ent. Tidskr.* 63: 1–59.
Sörensson, M. 1981. Anteckningar om intressanta aleochariner. *Ent. Tidskr.* 102: 62–64.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.