



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Nära hotad (NT)
B2ab(iii)

Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Cryptophagidae (fuktbaggar),
Släkte: *Atomaria*, **Art:** *Atomaria lapponica* Johnson, 1978 **Synonymer:**

Kännetecken

En långsmal mörkbrun art som blir cirka 1,8 mm lång. Täckvingarnas bas och spets är tydligt ljusare än resten av kroppen. Ibland finns även ett ljusare längsband på täckvingarna. Antennklubban är påfallande bred hos denna art och består av de tre sista lederna. *Atomaria*-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Utbredning och status

Utbredd från Medelpad till Lule lappmark. Arten nybeskrevs så sent som 1978, och är utanför Sverige endast känd från Finland och nordvästra Ryssland.

Ekologi

Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten påträffas främst i anslutning till klibbticka o.a. trädsvampar på gran, oftast i naturskogsliknande granbestånd.

Hot

Hotbilden är något oklar på grund av de bristfälliga kunskaperna om artens biologi, men den hör förmodligen hemma i gamla urskogsartade granbestånd.

Åtgärder

Bevara artens livsmiljö och förbättra om möjligt kunskaperna om dess biologi.

Litteratur

Persson, B. 1981. Nya landskapsfynd av skalbaggar. *Ent. Tidskr.* 102: 43–45.

Författare

Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.