



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Cryptophagidae (fuktbaggar),
Släkte: *Atomaria*, **Art:** *Atomaria munda* Erichson, 1846 **Synonymer:**

Kännetecken

En svart, cirka 1,6 mm lång skalbagge som har huvud, halssköld samt ben och antenner rödfärgade. Halsskölden har en tydlig tvärgående fåra vid basen. Antennernas tre sista leder bildar en svagt utformad klubba. *Atomaria*-arterna är svåra att artbestämna, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Utbredning och status

Utbredd från Skåne till Västmanland. Få sentida fynd. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsbredningen sträcker sig från Nordafrika och Västeuropa österut till Kazakstan.

Ekologi

Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten förekommer främst inomhus, i gamla stall, källare och uthus där den lever i till exempel möjligt hö och gammal spillningsblandad halm. Den har även påträffats utomhus vid några tillfällen, t.ex. i frökompost. I Danmark är arten funnen på svavelticka på en gammal ek.

Hot

Arten missgynnas av de allt mer hygieniska förhållandena i och kring stall och fähus.

Litteratur

Palm, T. 1931. Om coleopterfaunan i Ombergstrakten. *Ent. Tidskr.* 52: 13–79.

Författare

Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.