



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Cryptophagidae (fuktbaggar),
Släkte: *Atomaria*, **Art:** *Atomaria nigripennis* (Kugelann, 1794) **Synonymer:**

Kännetecken

En ganska högvälvd, cirka 1,5 mm lång svart art. Huvud och halssköld samt ben och antenner är däremot vackert ljusröda. Halsskölden och täckvingarna är fint punkterade. *Atomaria*-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Utbredning och status

Utbredd från Skåne till Dalarna. Få sentida fynd. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsbredningen sträcker sig från Nordafrika och Västeuropa österut till Kaukasus.

Ekologi

Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten förekommer främst inomhus, i källare bland till exempel möjligt och förmultnat virke eller tidningspapper, men även i möjligt hö och gammal spillningsblandad halm i stall och taklösa lador.

Hot

Arten har blivit betydligt sällsyntare på grund av den förbättrade hygien i hus, stall och lador.

Litteratur

Bruce, N. 1931. Bidrag till kännedom om svenska coleopteras geografiska utbredning samt några för Sverige nya samt sällsyntare arter. *Ent. Tidskr.* 52: 189–199.

Palm, T. 1931. Om coleopterfaunan i Ombergstrakten. *Ent. Tidskr.* 52: 13–79.

Författare

Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.