



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Bledius*, **Art:** *Bledius baudii* Fauvel, 1872 **Synonymer:**

Kännetecken

En 2,5-3 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, täckvingarna brunsvarta eller brunröda, benen brungula med mörkare lår. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.

Utbredning och status

Endast känd från Skåne (Kåsebergaåsens sydbrant vid Kåseberga) och Gotska Sandön. Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden liksom i Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika.

Ekologi

Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig sand. Hos oss dels i sandiga kustklingar med vegetationslösa, lodräta partier där sanden fuktas av framsipprande grundvatten, dels i dynsänkor. Också i Danmark (Jylland) funnen i fuktiga sänkor i dynlandskap. Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i sanden, och lever där på alger eller detritus. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas dels under försommaren, dels under sensommaren-hösten.

Hot

Arten är genom sin mycket begränsade förekomst och sina specifika habitatkrav mycket känslig för olika former av miljöpåverkan. Kåsebergaåsens branter hotas dels av igenväxning p.g.a. upphörd beteshävd, dels av exploatering.

Åtgärder

Igenväxande partier av Kåsebergaåsens branter måste röjas från buskar och träd, och åtminstone delvis hävdas genom bete.

Litteratur

Palm, T. 1938. Bidrag till kännedomen om den skånska coleopterfaunan. 2. Kåseberga- trakten. - *Opusc. Ent.* 3:38-49.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.