



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Bledius*, **Art:** *Bledius procerulus* Erichson, 1840 **Synonymer:**

## Kännetecken

En 3-3,5 mm lång kortvinge med kraftig, cylindrisk kroppsbyggnad och kraftiga, borstförsedda grävben. Kroppen är svart, täckvingarna brunröda med skutellarpartiet mörkare, benen gulröda. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.

## Utbredning och status

Endast känd från ett mycket begränsat område i södra Skåne, i Kåsebergaåsens sydbrant vid Kåseberga och Löderups strandbad. Saknas i övriga Norden, närmast i Baltikum (Litauen). Världsbredningen är begränsad till Mellan- och Sydeuropa.

## Ekologi

Lever underjordiskt på torr, solexponerad, vegetationsfattig sandmark. Hos oss uteslutande i sandiga kustklingor med sparsam vegetation. I Mellaneuropa har arten påträffats talrikt i övergivna bon av gul tuvmyra (*Lasius flavus*). Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i sanden. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas dels under försommaren, dels under sensommaren-hösten.

## Hot

Arten är genom sin mycket begränsade förekomst och sina specifika habitatkrav mycket känslig för olika former av miljöpåverkan. Kåsebergaåsens branter hotas dels av igenväxning p.g.a. upphörd beteshävd, dels av exploatering.

## Åtgärder

Igenväxande partier av Kåsebergaåsens branter måste röjas från buskar och träd, och åtminstone delvis hävdas genom bete.

## Litteratur

Palm, T. 1938. Bidrag till kännedomen om den skånska coleopterfaunan. 2. Kåseberga- trakten. - *Opusc. Ent.* 3:38-49.

## Författare

Håkan Ljungberg 2003. © ArtDatabanken, SLU 2006.