



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Sårbar (VU)  
B1ab(iii)+2ab(iii)

**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** Bolitochara, **Art:** Bolitochara lucida (Gravenhorst, 1802) **Synonymer:**

## Kännetecken

En 4,5–5 mm lång kortvinge med spolförmig kropp. Rödbrun, täckvingar svartbruna med vardera en ljusare fläck vid skuldran, bakkropp nära spetsen med ett svartbrunt tvärband. Ben och antenner rödgula.

## Utbredning och status

Känd från Skåne, Småland och Östergötland. Sentida fynd är gjorda i två begränsade områden i mellersta Skåne, bl.a. i Skärålid. Närmast i Norge, Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa och Nordafrika.

## Ekologi

Lever i och i anslutning till olika slags trädsvamp på gamla lövträd. I Sverige funnen på bok, och björkhögstubbar med fnöskticka, i fjällticka på alm- och eklågor och i svampig förna under grova boklågor med fnöskticka i bergbranter med grov, senvuxen bok. I Danmark är arten funnen på svavelticka och fjällticka på gamla ekar. Larvutvecklingen sker under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas främst under våren och försommaren.

## Hot

Arten förefaller vara helt knuten till bestånd av naturskogskaraktär, och hotas därför av avverkning eller gallring.

## Åtgärder

Bestånd med grov bok bör skyddas.

## Litteratur

Malmqvist, A. 2002. Inventering av vedlevande skalbaggar i Höör och Hörby kommuner 2002. Naturcentrum AB.  
Palm, T. 1968. Kortvingar, häfte 5. *Svensk Insektfauna* 9. Stockholm.

## Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.